

ひらたNEWS

…消化管のポリープ…

ポリープとは

腸粘膜より腸管の内腔に突出した極限性の隆起を総称してポリープと言います。病理組織学的に①腫瘍性ポリープ②非腫瘍性ポリープに分けられますが、非腫瘍性ポリープの癌化はまれです。腫瘍性ポリープは大きくなるにつれ癌化率が高くなるため治療が必要です。

臨床症状は大半は無症状です。症状としては血便・肛門出血がもつとも高頻度です。

早期発見するためには便秘・血便などの下腹部症状のある人は早めに大腸内視鏡検査を受けましょう。無症状の人も定期的に検査を受けましょう。

予防するための食事は脂肪は少なめに繊維質は多めにし、便通を整えるようにしましょう。

治療は

腫瘍性ポリープを発見したら、安全に処置できる範囲でできるだけ内視鏡的切除を行います。切除不可能な場合は外科的手術が必要です。切除後の組織学的検査で癌化が深部や切除断端までおおよぶ場合など、外科的手術の追加が必要な場合もあります。

ポリープ切除後の経過観察は

腫瘍性ポリープの場合は、再発や癌化の可能性があるため必ず定期的経過観察が必要です。完全切除が出来た場合でも一〜二年後には必ず内視鏡検査を受けた方が良いでしょう。指示に従うようにしましょう。

♪内視鏡検査に関するご相談には当院の看護師が受けいたします。

内視鏡室



ひらた医院は
医療を通じて
社会に貢献
いたします。

…花粉症の季節です…

冬の2か月ほどを除いて1年中花粉は飛散しています。外出から帰ったら玄関に入る前に洋服についた花粉を払い落としましょう。また、髪や体についた花粉を落とすため毎日入浴して体を清潔に保ちましょう。

日	月	火	水	木	金	土
2007 ~1月~ JANUARY					♪	♪
14 休診	15	16 CT	17	18 AM	19	20
21 休診	22	23	24	25 AM	26	27
28 休診	29	30	31	2/1 AM	2	3

- 胃・大腸内視鏡検査に関しましてはお気軽にスタッフまでお声をかけてください
- ヘリカル CT
1/16 (火) 9:00~12:30 …予約受付中…
- 2/14 (水) は夜間当番です (23時まで診療)

…インフルエンザ予防接種…

- 接種1回 2500円
 - 大分市在住 65歳以上の方 1000円
(65歳以上、大分市外の方も在住市の金額で接種できます)
- 期間：1/31まで

医療法人 健愛会

ひらた医院

胃腸科・肛門科・内科・外科

〒870-1143 大分市田尻 478

☎097-548-7616

✉info@hirataiin.com

☎http://www.hirataiin.com

診療時間：9時～18時

休診：日曜・祝日・木曜午後

急患：この限りではありません

院長 平田 孝浩

医学博士

外科専門医

消化器外科認定医

平成14年7月1日 ひらた医院開院